

# Nutramigen\* 1

Hypoallergen specialernæring til ernæringsmæssig håndtering af komælksproteinallergi  
En fødevarer til særlige medicinske formål

## Anvendelse

Nutramigen 1 er en ernæringsmæssig komplet specialernæring. Den er sammensat for at tilgodese det daglige næringsbehov hos komælksproteinallergiske spædbørn fra første leveuge og frem til ca. 6 måneders alderen. Derefter anbefales det at spædbarnet overgår til den alderstilpassede specialernæring Nutramigen 2 LGG®. Må ikke anvendes parenteralt.

## Fakta

- Baseret på højthydrolyseret kaseinprotein
- Nutramigen er effektiv og veldokumenteret<sup>1</sup>
- Laktosefri

## Holdbarhed

Uåbnet dåse skal opbevares tørt og køligt. Se "Bedst før" dato på dåsens bund. Åbnet dåse opbevares tørt, tæt lukket og anvendes inden for 1 måned. Pulveret bør ikke fryses og tåler ikke kraftig opvarmning.

## Distribution

Nutramigen 1 står på listen over tilskudsberettigede, godkendte ernæringsprodukter til børn, og kan udskrives på grøn recept eller købes i håndkøb på apoteket eller hos Mediq Danmark.

## Pakningsstørrelse

Dåse med 400 g pulver



## Vejledende dosering

Det anbefalede indtag afhænger af alder, kropsvægt, lidelsens art og indtaget af andre fødevarer. Brug tabellen nedenfor som vejledning.

| Alder    | Barnets vægt, kg | Flasker/døgn | Vand, ml | Måleskeer** | Færdigblanding, ml |
|----------|------------------|--------------|----------|-------------|--------------------|
| 0-2 uger | < 3-3,5          | 6            | 90       | 3           | 100                |
| 2-4 uger | 3,5-4            | 5-6          | 120      | 4           | 130                |
| 1-2 mdr  | 4-5              | 5            | 150      | 5           | 170                |
| 2-4 mdr  | 5-6,5            | 4-5          | 180      | 6           | 200                |
| 4-6 mdr  | >6,5             | 4            | 210      | 7           | 230                |

\*\*Anvend kun måleskeen i dåsen til pulveret. 1 strøgen måleske (4,5 g) pr. 30 ml vand

### VIGTIGT

Brystmælk er spædbarnets bedste ernæring. Hvis amningen afbrydes, kan det være svært at begynde at amme igen, og indtag af modermælkserstatning kan mindske produktionen af brystmælk. Man bør tænke på fordelene ved amning, inden modermælkserstatning introduceres. Det er meget vigtigt at følge instruktionerne om tilberedning. Fejltagtig håndtering kan påvirke barnets helbred. Forældre skal altid informeres af sundhedspersonale. Det er vigtigt at spise en varieret kost når du ammer. Nutramigen-sortimentet er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

# Nutramigen\* 1

## INGREDIENSER:

GLUKOSESIRUP, VEGETABILSKER OLIER (PALMEOLEIN, KOKOSNØD, SOJA, SOLSIKKE MED HØJT INDHOLD AF OLEINSYRE), HØJT HYDROLYSERET KASEIN (**FRA MÆLK**), MODIFICERET MAJSSSTIVELSE, KALCIUMCITRAT, KALIUMFOSFAT, KALCIUMFOSFAT, OLIE FRA *MORTIERELLA ALPINA*, KALIUMCHLORID, MAGNESIUMFOSFAT, OLIE FRA MIKROALGEN, *SCHIZOCHYTRIUM SP.*, KOLINCHLORID, NATRIUMCHLORID, L-CYSTIN, INOSITOL, L-TYROSIN, L-TRYPTOPHAN, TAURIN, JERN-SULFAT, L-CARNITIN, VITAMIN E (DL-ALFA-TOCOFERYLACETAT), ZINKSULFAT, VITAMIN C (ASKORBYLPALMITAT, ASKORBINSYRE), NIACIN (NIKOTINAMID), VITAMIN A (RETINYL PALMITAT), PANTOTHENSYRE (KALCIUMPANTOTHENAT), KOBBER-SULFAT, THIAMIN (THIAMINHYDROCHLORID), RIBOFLAVIN, VITAMIN B6 (PYRIDOXINHYDROCHLORID), MANGANSULFAT, NATRIUMIODID, FOLAT (FOLSYRE), NATRIUMMOLYBDAT, VITAMIN K (PHYTOMENADION), KROMCHLORID, NATRIUMSELENIT, BIOTIN (D-BIOTIN), VITAMIN D (CHOLECALCIFEROL), VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN).

| NÆRINGSINDHOLD           | ENHED     | PR. 100 G PULVER | PR. 100 ML FÆRDIGBLANDING |
|--------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| ENERGI                   | KJ (kcal) | 2098 (501)       | 284 (68)                  |
| FEDT                     | g         | 25               | 3,4                       |
| HERAF                    |           |                  |                           |
| - MÆTTEDE FEDTSYRER      | g         | 10               | 1,35                      |
| - LINOLSYRE              | g         | 4                | 0,54                      |
| - α-LINOLENSYRE          | mg        | 350              | 47                        |
| - ARAKIDONSYRE (ARA)     | mg        | 145              | 19,5                      |
| - DOCOSAHEXAENSYRE (DHA) | mg        | 115              | 15,5                      |
| KULHYDRATER              | g         | 55               | 7,4                       |
| HERAF SUKKERARTER        | g         | 5,7              | 0,77                      |
| PROTEIN                  | g         | 14               | 1,88                      |
| SALT                     | g         | 0,6              | 0,08                      |
| VITAMIN A, RE            | µg        | 450              | 61                        |
| VITAMIN D                | µg        | 12,5             | 1,68                      |
| VITAMIN E, α-TOCOFEROL   | mg        | 4,5              | 0,61                      |
| VITAMIN K                | µg        | 65               | 8,7                       |
| VITAMIN C                | mg        | 60               | 8,1                       |
| TIAMIN                   | mg        | 0,4              | 0,054                     |
| RIBOFLAVIN               | mg        | 0,45             | 0,061                     |
| NIACIN                   | mg        | 5                | 0,67                      |
| VITAMIN B6               | mg        | 0,3              | 0,04                      |
| FOLAT, DFE               | µg        | 135              | 18,2                      |
| FOLSYRE                  | µg        | 80               | 10,8                      |
| VITAMIN B12              | µg        | 1,5              | 0,2                       |
| BIOTIN                   | µg        | 15               | 2                         |
| PANTOTENSYRE             | mg        | 2,5              | 0,34                      |
| NATRIUM                  | mg        | 240              | 32                        |
| KALIUM                   | mg        | 610              | 82                        |
| CHLORID                  | mg        | 480              | 65                        |
| KALCIUM                  | mg        | 570              | 76                        |
| FOSFOR                   | mg        | 390              | 52                        |
| MAGNESIUM                | mg        | 38               | 5                         |
| JERN                     | mg        | 9                | 1,21                      |
| ZINK                     | mg        | 3,5              | 0,47                      |
| KOBBER                   | mg        | 0,38             | 0,05                      |
| MANGAN                   | mg        | 0,085            | 0,011                     |
| SELEN                    | µg        | 17,5             | 2,4                       |
| KROM                     | µg        | 11               | 1,48                      |
| MOLYBDÆN                 | µg        | 28               | 3,8                       |
| JOD                      | µg        | 115              | 15,5                      |
| KOLIN                    | mg        | 165              | 22                        |
| INOSITOL                 | mg        | 85               | 11,4                      |
| L-CARNITIN               | mg        | 12,5             | 1,68                      |
| TAURIN                   | mg        | 30               | 4                         |

OSMOLARITET 270 mOsm/L

### VIGTIGT

Brystmælk er spædbarnets bedste ernæring. Hvis amningen afbrydes, kan det være svært at begynde at amme igen, og indtag af modermælks-erstatning kan mindske produktionen af brystmælk. Man bør tænke på fordelene ved amning. Inden modermælks-erstatning introduceres. Det er meget vigtigt at følge instruktionerne om tilberedning. Følgelig håndtering kan påvirke barnets helbred. Forældre skal altid informeres af sundheds-personale. Det er vigtigt at spise en varieret kost når du ammer. Nutramigen-sortimentet er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

### Referenser:

1. Dupont C, Chouraqui JP, de Boissieu D, Bocquet A, Bresson JL, Briand A, Darmaun D, Frelut ML, Ghisolfi J, Girardier JP, Goulet O, Hankard R, Rieu D, Vidalhet M, Turck D. Dietary treatment of cows' milk protein allergy in childhood: a commentary by the Committee on Nutrition of the French Society of Paediatrics. Br J of Nutr 2011; page 1-14

\*Varemærke tilhører Mead Johnson og Company, LLC. ©2024 Mead Johnson & Company, LLC. Alle rettigheder forbeholdes



SCANDINAVIAN  
BIOPHARMA

Scandinavian Biopharma  
Industrivägen 1, 171 48 Solna, Sverige  
Tlf. DK: 4649 8676