

Nutramigen PURAMINO*

Hypoallergen spesialnæring basert på frie aminosyrer
Næringsmiddel til spesielle medisinske formål

Indikasjoner

Til kostbehandling av:

- Alvorlig kumelkproteinallergi
- Multiple matvallerger
- Når et høygradig hydrolysat ikke har hatt effekt
- Andre indikasjoner som krever elementaldiett inkl. eosinofil øsofagitt og manglende vekst

Bruksområde

Nutramigen PURAMINO er en ernæringsmessig fullverdig spesialnæring. Den er sammensatt for å ivareta spedbarnets næringsbehov fra første leveuke ved overnevnte indikasjoner. Produktet kan brukes som eneste næringskilde frem til 6 måneders alder, og videre som en del av et variert kosthold. Må ikke brukes parenteralt.

Fakta

- Basert på 100 % frie aminosyrer
- 33 % MCT-olje[#] som er en lett tilgjengelig kilde til fett og energi¹
- Laktosefri
- Kosher- og halalsertifisert
- Uten smakstilsetning

Tilberedning

1. Vask hendene grundig. Vask og kok flasker, smokker, lokk og andre redskaper (minst 5 minutter i kokende vann).
2. Kok opp rent vann. Kjøøl ned til 70 grader. Hell ønsket mengde vann i en ren flaske.
3. Fyll måleskjeen med pulver (måleskjeen skal **kun** brukes til å måle pulver). Ikke press pulveret ned i måleskjeen. Stryk av måleskjeen med baksiden av en ren, tørr kniv. Ha i det riktige antallet måleskjeer i flasken, og oppbevar måleskjeen **tørr** i boksen.
4. Lukk flasken, snu den og **rist godt** til pulveret er helt oppløst. Kjøøl blandingen ned til spisetemperatur før du gir den til barnet. Kontrollér temperaturen på innsiden av håndledet.
5. **Når spesialnæringen er tilberedt, har den svært kort holdbarhet. Gi den til barnet umiddelbart etter at den er tilberedt, innen to timer.** Tilbered kun ett måltid om gangen. Når du har begynt å gi barnet spesialnæringen, skal den brukes innen én time eller kastes. **Tilberedt spesialnæring må ikke fryses.**

Holdbarhet

Uåpnet boks skal oppbevares tørt og kjølig. Se "Best før"-dato på bunnen av boksen. Åpnet boks oppbevares tørt, tett lukket og brukes innen 1 måned. Pulveret bør ikke fryses og ikke utsettes for kraftig oppvarming.

Av totalt fett. MCT = Mellomlange kjedede triglyserider



Varenummer: 819408

Dosering

Tabellen under er veiledende. Det er individuelt hvor mye et barn spiser.

Alder	Barnets vekt, kg	Flasker/døgn	Vann, ml	Måle-skjeer**	Ferdig blandning, ml
0-2 uker	< 3-3,5	6-7	90	3	100
2-4 uker	3,5-4	5-6	120	4	130
1-2 måneder	4-5	5	150	5	170
2-4 uker	5-6,5	4-5	180	6	200
4-6 måneder	6,5-7,5	4	210	7	230
6-12 måneder	7,5-9,5	2-3	240	8	260
> 1 år	> 9,5	2-3	240	8	260

** Bruk **kun** måleskjeen i boksen til pulveret. 1 strøken måleskje (4,4 g) pr 30 ml vann.

Pakningstørrelse

Boks med 400 g pulver

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Nutramigen PURAMINO*

INGREDIENSER:

GLUKOSE SIRUP, VEGETABILISKE OLJER (SOLSIKKEOLJE MED HØYT OLJESYREINNHOLD, MELLOMLANGE KJEDEDE TRIGLYSERIDER FRA KOKOSNØTT/PALMEKJERNE (9,3%), SOYA), MODIFISERT TAPIOKASTIVELSE, KALIUMASPARTAT, L-LEUCIN, L-LYSINHYDROKLORID, KALSIUMFOSFAT, L-PROLIN, L-ALANIN, L-VALIN, L-ISOLEUCIN, MONONATRIUMGLUTAMAT, L-TREONIN, L-SERIN, L-TYROSIN, L-ASPARTAT, L-ARGININ, L-FENYLALANIN, MAGNESIUMFOSFAT, L-HISTIDIN, L-CYSTIN, GLYCIN, L-TRYPTOFAN, OLJE FRA MORTIERELLA ALPINA, L-METIONIN, KALIUMKLORID, OLJE FRA MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP., KALSIUMSITRAT, KOLINKLORID, NATRIUMSITRAT, INOSITOL, VITAMIN C (ASKORBINSYRE), JERNSULFAT, TAURIN, SINKSULFAT, L-KARNITIN, VITAMIN E (DL-ALFA-TOKOERYL-ACETAT), NIACIN (NIKOTINAMID), PANTOTENSYRE (KALSIUMPANTOTENAT), VITAMIN A (RETINYL PALMITAT), KOBBERSULFAT, VITAMIN B6 (PYRIDOKSINHYDROKLORID), TIAMIN (TIAMINHYDROKLORID), RIBOFLAVIN, MANGANSULFAT, NATRIUMJODID, KROMKLORID, FOLAT (FOLSYRE), VITAMIN K (FYTOMENADION), NATRIUMSELENT, NATRIUMMOLYBDAT, BIOTIN (D-BIOTIN), VITAMIN D (KOLEKALSIFEROL), VITAMIN B12 (CYANOKOBALAMIN).



NÆRINGSINNHOOLD	ENHET	PR 100G PULVER	PR 100 ML FERDIG BLANDING
ENERGI	KJ (kcal)	2140 (510)	285 (68)
FETT, HVORAV	g	28	3,7
- METTEDE FETTSYRER	g	10,7	1,41
- LINOLENSYRE	g	3,5	0,46
- α-LINOLENSYRE	mg	370	49
- ARAKIDONSYRE (ARA)	mg	148	19,5
- DOKOSAHEKSAENSYRE (DHA):	mg	117	15,5
KARBONHYDRATER	g	52	6,9
HVORAV SUKKERARTER	g	4,2	0,55
PROTEIN	g	14,3	1,88
SALT	g	0,42	0,06
VITAMIN A, RE	µg	430	57
VITAMIN D	µg	12,25	1,63
VITAMIN E α-TOKOFEROL	mg	4,6	0,61
VITAMIN K	µg	46	6,1
VITAMIN C	mg	48	6,4
TIAMIN	mg	0,31	0,04
RIBOFLAVIN	mg	0,41	0,054
NIACIN	mg	4,7	0,63
VITAMIN B6	mg	0,38	0,05
FOLAT, DFE	µg	87	11,4
FOLSYRE	µg	52	6,9
VITAMIN B12	µg	0,92	0,121
BIOTIN	µg	12,2	1,62
PANTOTENSYRE	mg	2,9	0,38
NATRIUM	mg	168	22
KALIUM	mg	730	96
KLORID	mg	450	60
KALSIUM	mg	580	76
FOSFOR	mg	330	44
MAGNESIUM	mg	61	8,1
JERN	mg	7,7	1,01
SINK	mg	4,6	0,61
KOBBER	mg	0,38	0,05
MANGAN	mg	0,087	0,011
SELEN	µg	18,4	2,4
KROM	µg	26	3,4
MOLYBDEN	µg	15,8	2,1
JOD	µg	102	13,5
KOLIN	mg	163	22
INOSITOL	mg	87	11,4
L-KARNITIN	mg	10,2	1,35
TAURIN	mg	31	4

OSMOLARITET 314 mOsm/L

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Referanser: 1. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, Dias JA, Heuschkel R, Husby S, et al. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guidelines. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2012;55(2):221-9

*Varemerke tilhører Mead Johnson og Company, LLC © 2024 Mead Johnson & Company, LLC. Alle rettigheter forbeholdes.

RKT - M - 41347



SCANDINAVIAN
BIOPHARMA

Scandinavian Biopharma
Industrivägen 1, 171 48 Solna, Sverige
Kundesenter: 23 96 23 00