

# Nutramigen

## PURAMINO\* JUNIOR

Hypoallergen aminosyrbaserad specialnärning  
Ett livsmedel för speciella medicinska ändamål

### Indikationer

För kostbehandling av:

- Svår komjölksproteinallergi
- Multipel födoämnesallergi
- Då en extensivt hydrolyserad specialnärning inte haft effekt.
- Andra indikationer som kräver elementardiet inkl. eosinofil esofagit och försämrad tillväxt

### Användning

Nutramigen PURAMINO JUNIOR är näringsmässigt komplett och avsedd för barn från 1 års ålder och framåt vid ovan nämnda indikationer. Den kan användas som en del av en varierad kost, drickas som kosttillskott eller användas som berikning i mat. Produkten kan också användas som enda näringskälla. Får inte användas till parenteralt bruk.

### Fakta

- Baserad på 100 % fria aminosyror
- 33 % MCT-olja<sup>#</sup> som är en enkelt tillgänglig fett- och energikälla<sup>1</sup>
- Med 0,5 % DHA av totalt fett
- Laktosfri
- Kosher- och halalcertifierad
- Ej smaksatt

### Hållbarhet

Öppnad förpackning förvaras torrt och svalt. Se "Bäst före" datum på förpackningens botten. Öppnad förpackning förvaras torrt och svalt, väl försluten och förbrukas inom 1 månad. Frys inte pulvret och utsätt det inte för kraftig uppvärmning.

### Förpackning

Burk 400 g pulver



### Dosering

Flexibel dosering som kan anpassas individuellt efter behov. Intag av Nutramigen PURAMINO JUNIOR ska bestämmas av läkare eller dietist och beror på ålder, kroppsvikt, hälsotillstånd och annan kost.

| Kcal/ml | Antal skopor** | Vatten, ml | Ca. volym |
|---------|----------------|------------|-----------|
| 1,00    | 3              | 90         | 100       |

\*\*Fyll skopan med pulver (använd **endast** skopan i burken). Pressa inte ner pulvret. Det ska vara en struken skopa. Lägg tillbaka **torr** skopa i burken. 1 struken skopa (6,8 g) till 30 ml vatten ger en koncentration av ca. 1 kcal/ml.

### Distribution

Nutramigen PURAMINO JUNIOR är L-märkt och kan förskrivas på livsmedelsanvisning eller köpas receptfritt på apotek. Varunummer: 691085.

<sup>#</sup>Av totalt fett. MCT = Medellångkedjiga triglycerider

**VIKTIGT: Bröstmjolk är spädbarnets bästa föda.** Om amningen avbryts kan det vara svårt att börja igen och tillägg av ersättning kan minska tillgången på bröstmjolk. Man bör tänka igenom amningens fördelar innan ersättning introduceras. Det är viktigt med en balanserad kost för ammande mammor. Det är mycket viktigt att följa tillredningsinstruktionerna. Felaktig hantering kan påverka spädbarnets hälsa. Föräldrarna skall alltid informeras av vårdcentral gällande barnets hälsa. Nutramigen- produkter måste användas under medicinsk övervakning.

# Nutramigen PURAMINO® JUNIOR

INGREDIENSER:

GLUKOSSIRAP, VEGETABILISKA OLJOR (OLJESYRARIK SOL-ROSOLJA, MEDELLÅNGKEDJIGA TRIGLYCERIDER FRÅN KOKOSNÖT/PALMKÄRNA (7, 3%), SOJAOLJA), MODIFIERAD TAPIOKASTÄRKELSE, KALIUMASPARTAT, L-LEUCIN, L-LYSINHYDROKLORID, L-PROLIN, L-ALANIN, KALCIUMFOSFAT, L-VALIN, L-ISOLEUCIN, MONONATRIUMGLUTAMAT, L-TREONIN, L-SERIN, L-TYROSIN, L-ASPARTAT, L-ARGININ, L-FENYLALANIN, MAGNESIUMFOSFAT, KALCIUMCITRAT, L-HISTIDIN, L-CYSTIN, GLYCIN, L-TRYPTOFAN, L-METIONIN, NATRIUMCITRAT, OLJA FRÅN MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP., KOLINKLORID, INOSITOL, VITAMIN C (ASKORBINSYRA), TAURIN, FERROSULFAT, ZINKSULFAT, L-KARNITIN, VITAMIN E (DL-ALFA-TOKOERYLACETAT), NIACIN (NIKOTINAMID), PANTOTENSYRA (KALCIUMPANTOTENAT), KOPPARSULFAT, VITAMIN A (RETINYLPALMITAT), VITAMIN B6 (PYRIDOXINHYDROKLORID), MANGANSULFAT, TIAMIN (TIAMINHYDROKLORID), RIBOFLAVIN, VITAMIN D (KOLEKALCIFEROL), NATRIUMJODID, FOLSYRA, NATRIUMMOLYBDAT, NATRIUMSELENIT, KROMKLORID, VITAMIN K (FYTOMENADION), BIOTIN (D-BIOTIN), VITAMIN B12 (CYANOKOBALAMIN)



Referenser:

1. Bach AC, Babayan VK. Medium-chain triglycerides: an update. Am J Clin Nutr. 1982;36(5):950–62. 2023 Oct RKT-M-38215

| NÄRINGSVÄRDE             | ENHET     | PER 100 G PULVER | PER 100 ML FÄRDIG BLANDNING** |
|--------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| ENERGI                   | KJ (kcal) | 2050 (490)       | 420 (100)                     |
| FETT, VARAV              | g         | 22               | 4,5                           |
| - MÄTTAT FETT            | g         | 8,3              | 1,69                          |
| - LINOLSYRA              | g         | 2,9              | 0,59                          |
| - α-LINOLENSYRA          | mg        | 310              | 63                            |
| - DOKOSAHEXAENSYRA (DHA) | mg        | 113              | 23                            |
| KOLHYDRAT                | g         | 59               | 12,1                          |
| VARAV SOCKERARTER        | g         | 5,3              | 1,08                          |
| PROTEINEKVIVALENT        | g         | 13,7             | 2,8                           |
| SALT                     | g         | 0,49             | 0,1                           |
| VITAMIN A, RE            | µg        | 300              | 61                            |
| VITAMIN D                | µg        | 6,75             | 1,4                           |
| VITAMIN E α-TE           | mg        | 5,9              | 1,2                           |
| VITAMIN K                | µg        | 19,6             | 4                             |
| VITAMIN C                | mg        | 49               | 10                            |
| TIAMIN                   | mg        | 0,37             | 0,075                         |
| RIBOFLAVIN               | mg        | 0,49             | 0,1                           |
| NIACIN                   | mg        | 4,9              | 1                             |
| VITAMIN B6               | mg        | 0,49             | 0,1                           |
| FOLSYRA                  | µg        | 74               | 15                            |
| VITAMIN B12              | µg        | 1,23             | 0,25                          |
| BIOTIN                   | µg        | 10,8             | 2,2                           |
| PANTOTENSYRA             | mg        | 2,1              | 0,43                          |
| NATRIUM                  | mg        | 196              | 40                            |
| KALIUM                   | mg        | 490              | 100                           |
| KLORID                   | mg        | 300              | 61                            |
| KALCIUM                  | mg        | 490              | 100                           |
| FOSFOR                   | mg        | 290              | 60                            |
| MAGNESIUM                | mg        | 78               | 16                            |
| JÄRN                     | mg        | 4,9              | 1                             |
| ZINK                     | mg        | 4,4              | 0,9                           |
| KOPPAR                   | mg        | 0,54             | 0,11                          |
| MANGAN                   | mg        | 0,28             | 0,057                         |
| SELEN                    | µg        | 15,7             | 3,2                           |
| KROM                     | µg        | 14,7             | 3                             |
| MOLYBDEN                 | µg        | 22               | 4,5                           |
| JOD                      | µg        | 74               | 15                            |
| KOLIN                    | mg        | 108              | 22                            |
| INOSITOL                 | mg        | 83               | 17                            |
| L-KARNITIN               | mg        | 9,8              | 2                             |
| TAURIN                   | mg        | 29               | 6                             |

OSMOLARITET 480 mOsm/L

\*\*20,4 gram pulver (3 skopor) + 90 ml vatten

**VIKTIGT: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda.** Om amningen avbryts kan det vara svårt att börja igen och tillägg av ersättning kan minska tillgången på bröstmjölk. Man bör tänka igenom amningens fördelar innan ersättning introduceras. Det är viktigt med en balanserad kost för ammande mammor. Det är mycket viktigt att följa tillredningsinstruktionerna. Felaktig hantering kan påverka spädbarnets hälsa. Föräldrarna skall alltid informeras av vårdcentral gällande barnets hälsa. Nutramigen- produkter måste användas under medicinsk övervakning.

\*Registrerat varumärke tillhörande Mead Johnson & Company.  
Alla rättigheter förbehållna. LGG\* är ett registrerat varumärke tillhörande Chr. Hansen A/S.

April 2024 RKT- M- 54243



SCANDINAVIAN  
BIOPHARMA

Scandinavian Biopharma Distribution AB  
Industrivägen 1, 171 48 Solna  
Kundtjänst: 08 586 33 500